

| レジメン名称 | 1コース | 催吐性リスク |
|--------------|------|-----------|
| mXELIRI+Bmab | 21日間 | 中等度催吐性リスク |

| 薬剤 | 用量 | 用法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|
| カペシタビン(ゼローダ) | 1600mg/m ² *1 | 2×朝・夕食後 | ● | → | | | | | | | | | | | | | ● | 内服14日間で終了 | | | | | | | |
| アプレピタント125mg(イメド) | 1cp | 1×化学療法60～90分前 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アプレピタント80mg(イメド) | 1cp | 1×朝 | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 滴下順 | 薬剤 | 用量 | ルート | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | パロノセトロン0.75mg デキサメタゾン | 1バッグ 3.3mg | メイン | 15分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ベバシズマブ 生理食塩液 | 7.5mg/kg 100mL | メイン | 1時間30分*2 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | イリノテカン 5%ブドウ糖 | 150mg/m ² 250mL | メイン | 1時間30分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 生理食塩液 | 50mL | メイン | 15分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 XELIRIにおけるカペシタビンの用量は1600mg/m²/dayであり、他のレジメンのカペシタビン併用時の用量(2000mg/m²/day)とは異なるため注意すること。

※2 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行ってもよい。2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与可能。