レジメン名称	1コース	催吐性リスク
AP（子宮内膜間質肉腫）	21日間	高度催吐性リスク

	薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	イメンド125mg	1cp	1×化学療法60～90分前	●																				
	イメンド80mg	1cp	1×朝		●	●																		
	デキサメタゾン	8mg	1×朝		●	●	●																	

滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ラクテック	500mL	メイン	2時間	●																				
2	ラクテック 硫酸Mg補正液1mEq/mL	500mL 1A	メイン	2時間	●																				
3	パロノセトロン0.75mg/50mL デキサメタゾン	1バッグ 9.9mg	メイン	30分	●																				
4	ドキソルビシン 生理食塩液	60mg/㎡ 50mL	メイン	15分	●																				
5	シスプラチン 生理食塩液	100mg/㎡ 300mL	メイン	2時間	●																				
6	20%マンニトール	300mL	メイン	30分	●																				
7	フロセミド20mg	1A	側管	静注	●																				
8	ソリタT3	500mL	メイン	2時間	●																				
9	ソリタT3	500mL	メイン	2時間	●																				
10	ソリタT3	500mL	メイン	2時間	●																				