




| レジメン名称 | 1コース | 催吐性リスク |
|--------|------|-----------|
| IFM単剤 | 21日間 | 中等度催吐性リスク |

| | | 薬剤 | 用量 | 用法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|-----|------------|-----------------------|-------------|--------------------------|---|---|---|---|--|--|---|----|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | デキサメタゾン | 8mg(16錠) | 2×朝・昼 | | | | | | ● | ● | ○* | ※○は嘔気によって内服可 | | | | | | | | | | | | | |
| 滴下順 | 薬剤 | 用量 | ルート | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | 5%ブドウ糖液 | 500mL | メイン | 2時間 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | メイロン静注7% | 5mL | 側管 | 30分 | ● | ● | ● | ● | ● |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液 | 125mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | グラニセトロン3mg | 1/バッグ | メイン | 30分 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | デキサメタゾン | 9.9mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ウロミテキサン※ | 300mg/m ² | イホマイド投与開始時 | 2分 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | イホスファミド★ | 1500mg/m ² | メイン | 30分 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液 | 100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 生理食塩液 | 100mL | 側管 | 2時間 | ● | ● | ● | ● | ● |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | メイロン静注7% | 15mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 生理食塩液 | 375mL | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウロミテキサン※ | 300mg/m ² | イホマイド投与4時間後 | 2分 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| 7 | メイロン静注7% | 20mL | 側管 | 2時間30分 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ソリタT3 | 500mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 生理食塩液 | 500mL | 側管 | 2時間30分 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ウロミテキサン※ | 300mg/m ² | イホマイド投与8時間後 | 2分 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ソリタT3 | 500mL | 側管 | 翌日までキープ or ヘパリンロック | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ウロミテキサンはイホマイド投与開始時、イホマイド投与4時間後、イホマイド投与8時間後の3回

★イホスファミドは揮発性抗がん剤のため閉鎖式点滴ルート使用