レジメン名称	1コース	催吐性リスク
CPT−11+CDDP（子宮頚癌）	28日間	中等度催吐性リスク

	薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	デキサメタゾン	8mg(16錠)	2×朝・昼		●	●	○※					●	●	○※					●	●	○※										

滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ソリューゲンF	500mL	メイン	2時間	●							●							●												
2	グラニセトロン3mg デキサメタゾン	1バッグ 9.9mg	メイン	30分	●							●							●												
3	イリノテカン 生理食塩液	60mg/㎡ 250mL	メイン	150mL/hr	●							●							●												
4	シスプラチン 生理食塩液	60mg/㎡ 350mL	メイン	2時間	●																										
5	ソリューゲンF	500mL	メイン	150mL/hr	●																										
6	ソリューゲンG	500mL	メイン	150mL/hr	●																										
7	アセトキープ3G	500mL	メイン	150mL/hr	●																										
8	ソリューゲンF	500mL	メイン	150mL/hr	●																										
4	生理食塩液	50mL	メイン	15分								●							●												