レジメン名称	1コース	催吐性リスク
PI	21日間	高度催吐性リスク

	薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	イメンド125mg	1cp	1×化学療法60～90分前	●																				
	イメンド80mg	1cp	1×朝		●	●	○※	○※																
	デキサメタゾン	8mg(16錠)	2×朝・昼					●	●	●	○※	※○は嘔気によって内服可												

滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	5%ブドウ糖液	500mL	メイン	2時間	●	●	●	●																	
2	メイロン静注7% 生理食塩液	5mL 125mL	メイン	30分	●	●	●	●																	
3	グラニセトロン3mg デキサメタゾン	1バッグ 9.9mg	メイン	30分	●	●	●	●																	
4	ウロミテキサン	300mg/㎡	メイン	2分	●	●	●	●																	
5	イホスファミド 生理食塩液	1500mg/㎡ 100mL	メイン	30分	●	●	●	●																	
6	シスプラチン 生理食塩液	20mg/㎡ 450mL	メイン	2時間	●	●	●	●																	
7	メイロン静注7% 生理食塩液	15mL 375mL	メイン	30分	●	●	●	●																	
8	ウロミテキサン	300mg/㎡	メイン	2分	●	●	●	●																	
9	メイロン静注7%	20mL	メイン	2時間	●	●	●	●																	

9	ソリタT3	500mL	メイン	2時間	●	●	●	●																	
10	生理食塩液	500mL	メイン	2時間30分	●	●	●	●																	
11	ウロミテキサン	300mg/㎡	メイン	2分	●	●	●	●																	
12	ソリタT3	500mL	メイン	2時間	●	●	●	●																	
13	生理食塩液	500mL	メイン	10時間	●	●	●	●																	