

# C+TripleIT+weekly L-asp

薬剤	用量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6MP	125 mg/m <sup>2</sup> MAX200mg	PO 分2 朝食前 就寝前 (空腹時)	■	■	■	■	■									
CPA* 生理食塩液	400 mg/m <sup>2</sup> no limit 100 mL	DIV 1hr 側管	■													
Ara-C 生理食塩液	50 mg/m <sup>2</sup> no limit 50 mL	DIV 1hr側管 (12hr毎)	■	■	■	■	■	■								
L-as 注射用水	6000 U/m <sup>2</sup> no limit 0.6 mL/m <sup>2</sup>	i.m.	■							■						
Ara-C 生理食塩液	50 mg/m <sup>2</sup> no limit 50 mL	DIV 1hr側管 (12hr毎)	■	■	■	■	■	■								
MTX 注射用水	12 mg 4.8 mL	IT	■													
Ara-C	30 mg 1.5mL															
HDC	25 mg 0.5mL															

CPA、Ara-Cは側管(医師が別でオーダーするためメインの輸液はレジメンには登録していない)

\*シクロホスファミドが揮発性のため、day1は閉鎖式ルートを使用すること

斜線のday5,6のAra-Cは、発熱など副作用により延期された場合の予備日として入力。原則、延期がなければ斜線日は行わない