VLPAC

薬剤	用量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
PSL	60 mg/㎡ MAX80mg	PO 分3																																										
		または																																										
	30 mg/㎡ MAX40mg	IV																																										
	15 mg/㎡ MAX20mg																																											
生理食塩液	100 mL	DIVメイン								3hr							3hr							3hr																				
生理食塩液	50 mL	DIVメイン																													1hr													
VCR	2 mg/㎡ MAX2mg	IV 1min																																										
生理食塩液	20 mL/㎡ MAX20mL	側管																																										
ADR	25 mg/㎡ no limit	DIV 1hr																																										
生理食塩液	50 mL	側管																																										
CPA*	1200 mg/㎡ no limit	DIV 1hr																																										
生理食塩液	100 mL	側管																																										
L-asp	2000 U/㎡ no limit																																											
注射用水	2 mL/㎡	DIV 3hr																																										
YDソリタT3	200 mL																																											
MTX	12 mg																																											
注射用水	4.8 mL	IT																																										
Ara-C	30 mg 1.5mL																																											
HDC	25 mg 0.5mL																																											
MTX	12 mg	中枢浸潤																																										
注射用水	4.8 mL	ある場合																																										
HDC	25 mg 0.5mL	IT																																										

制吐剤などの支持療法は医師の判断でオーダするためレジメンに登録していません

*シクロホスファミドが揮発性のため、day8は閉鎖式ルートを使用すること