

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
CE+アテゾリズマブ療法	21日間	中等度催吐性リスク

	薬剤	用量	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		イメンド125mg	1cp	1×化学療法60～90分前		●																			
	イメンド80mg	1cp	1×朝			●	●																		
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生理食塩液	50ml	メイン	15分	●																				
2	アテゾリズマブ 生食	1200mg 250ml	メイン	60分※	●																				
3	生理食塩液	50ml	メイン	15分	●																				
4	パロノセトロン0.75mg デキサメタゾン	1バッグ 3.3mg	メイン	15分	●																				
5	カルボプラチン 生理食塩液	AUC5 250mL	メイン	1時間	●																				
6	エトポシド 5%ブドウ糖液	100mg/m ² 500mL	メイン	1時間30分※	●																				
7	生理食塩液	50mL	メイン	15分	●																				
1	デキサメタゾン 生理食塩液	3.3mg 50mL	メイン	15分		●	●																		
2	エトポシド 5%ブドウ糖液	100mg/m ² 500mL	メイン	1時間30分※		●	●																		
3	生理食塩液	50mL	メイン	15分		●	●																		

CE療法は4クールまで。その後はアテゾリズマブ療法のみを3週毎に継続

注:PVCフリールートを使用すること

注:アテゾリズマブはインラインフィルター使用

※ アテゾリズマブは忍容性に問題がなければ2回目以降30分に短縮可

※ エトポシドは調製後時間経過とともに結晶析出するため、調製後8時間以内に終了すること