

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
CE療法	21日間	中等度催吐性リスク

薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
イメンド125mg	1cp	1×化学療法60~90分前	●																				
イメンド80mg	1cp	1×朝		●	●																		
デキサメタゾン	8mg	1×朝				●																	

滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	パロノセトロン0.75mg デキサメタゾン	1バッグ 3.3mg	メイン	15分	●																				
2	エトポシド 5%ブドウ糖液	80mg/m <sup>2</sup> 500mL	メイン	1時間30分※	●																				
3	カルボプラチン 生理食塩液	AUC5 250mL	メイン	1時間	●																				
4	生理食塩液	50mL	メイン	15分	●																				
1	デキサメタゾン 生理食塩液	3.3mg 50mL	メイン	15分		●	●																		
2	エトポシド 5%ブドウ糖液	80mg/m <sup>2</sup> 500mL	メイン	1時間30分※		●	●																		
3	生理食塩液	50mL	メイン	15分		●	●																		

注:PVCフリールート使用すること

※ エトポシドは調製後時間経過とともに結晶析出するため、調製後3時間以内に終了すること