

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
PE療法	21日間※放射線併用時は28日間	高度等度催吐性リスク

薬剤		用量	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
イメンド125mg		1cp	1×化学療法60～90分前		●																				
イメンド80mg		1cp	1×朝			●	●																		
デキサメタゾン		8mg	2×朝昼					●																	
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生理食塩液 硫酸マグネシウム20mEq	500mL 1A	メイン	1時間	●																				
2	ソリタT3	500mL	メイン	1時間	●																				
3	パロノセトロン0.75mg デキサメタゾン	1バッグ 9.9mg	メイン	15分	●																				
4	エトポシド 5%ブドウ糖液	100mg/m ² 500mL	メイン	1時間30分※	●																				
5	シスプラチン 生理食塩液	80mg/m ² 250mL	メイン	2時間	●																				
6	ソリタT3	500mL	メイン	1時間30分	●																				
7	20%マンニトール	300mL	メイン	1時間	●																				
8	生理食塩液	500mL	メイン	1時間30分	●																				
9	ソリタT3	500mL	メイン	1時間30分	●																				
	フロセミド20mg	1A	側管	静注	●																				
1	デキサメタゾン	6.6mg	メイン	15分		●	●																		
	生理食塩液	50mL																							
2	エトポシド	100mg/m ²	メイン	1時間30分※		●	●																		
	5%ブドウ糖液	500mL																							
3	生理食塩液	500ml	メイン	1時間30分		●	●																		

注:PVCフリールート使用すること

※ エトポシドは調製後時間経過とともに結晶析出するため、調製後3時間以内に終了すること