レジメン名称	1コース	催吐性リスク
GC 4週間	28日間	軽度催吐性リスク(day1,8,15)、高度催吐性リスク(day2)

	薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	イメンド125mg	1cp	1×化学療法60～90分前		●																										
	イメンド80mg	1cp	1×朝			●	●																								
	デキサメタゾン	8mg	1×朝 or 2×朝・昼			●	●	●	○※	※○は嘔気によっ5日目まで内服も可																					

滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6mg 100mL	メイン	30分	●							●							●												
2	ゲムシタビン 生理食塩液	1000mg/㎡ 100mL	メイン	30分	●							●							●												
3	生理食塩液	50mL	メイン	15分	●							●							●												
1	ソリューゲンG	500mL	メイン	2時間		●																									
2	ソリューゲンF	500mL	メイン	2時間		●																									
3	5%ブドウ糖	500mL	メイン	2時間		●																									
	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75mg/50mL 9.9mg	側管	30分		●																									
4	マンニトール	300mL	メイン	20分		●																									
5	シスプラチン 生理食塩液	70mg/㎡ 300mL	メイン	2時間		●																									
6	5%ブドウ糖 ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ	500mL 10mEq	メイン	1時間30分		●																									
7	生理食塩液 ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ	500mL 10mEq	メイン	1時間30分		●																									
8	生理食塩液 ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ	500mL 10mEq	メイン	1時間30分		●																									