

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
MVEC	28日間	軽度催吐性リスク(day1,15,22)、高度催吐性リスク(day2)

薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イメンド125mg	1cp	1×化学療法60～90分前	●																											
イメンド80mg	1cp	1×朝			●	●																								
デキサメタゾン	8mg	1×朝 or 2×朝・昼			●	●	●	○*	※○は嘔気によつ5日目まで内服も可																					

滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ソリューゲンG 炭酸水素ナトリウム	500mL 20mL	メイン	2時間	●																											
2	アセタゾラミドナトリウム 生理食塩液	250mg 50mL	側管	30分	●																											
3	メトレキサート 生理食塩液	30mg/m <sup>2</sup> 50mL	側管	30分	●																											
4	ソリューゲンG 炭酸水素ナトリウム	500mL 20mL	メイン	2時間	●																											
5	アセトキープ3G 炭酸水素ナトリウム	500mL 20mL	メイン	2時間	●																											
1	ソリューゲンG	500mL	メイン	2時間	●																											
2	ソリューゲンG	500mL	メイン	2時間	●																											
3	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75mg 9.9mg	側管	15分	●																											
4	ピンブラスチン 生理食塩液	3mg/m <sup>2</sup> 50mL	メイン	15分	●																											
5	エピルビシン 生理食塩液	30mg/m <sup>2</sup> 50mL	メイン	15分	●																											
6	生理食塩液	50mL	メイン	30分	●																											
7	20%マンニトール	300mL	メイン	30分	●																											
8	シスプラチン 生理食塩液	70mg/m <sup>2</sup> 300mL	メイン	2時間	●																											
9	アセトキープ3G	500mL	メイン	2時間	●																											
10	アセトキープ3G	500mL	メイン	2時間	●																											

day15,22は2ページ目に記載

