

| レジメン名称 | 1コース | 催吐性リスク |
|-------------------|------|----------|
| Weekly PTX(尿路上皮癌) | 21日間 | 軽度催吐性リスク |

| 滴下順 | 薬剤 | 用量 | ルート | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|-----|---|-------------------------------|-----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | デキサメタゾン d-クロルフェニラミン ファモチジン 生理食塩液 | 6.6mg 5mg 20mg 100mL | メイン | 30分 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
| 2 | パクリタキセル 生理食塩液 | 80mg/m ² 250mL | メイン フィルター付 専用ルートを 使用すること | 1時間 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
| 3 | 生理食塩液 | 50mL | メイン | 15分 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |

※毎週投与