

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
EMA/CO	14日間	高度催吐性リスク

内服薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
アプレピタント	125mg/回 80mg/回	抗がん剤投与60-90分前 1×朝	●	●	●											
ロイコボリン錠	15mg/回	1日2回12時間毎		●	●	メトトレキサート開始24時間後より内服開始										

滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	生理食塩液	500mL	メイン	投与終了まで	●	●												
2	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75mg/50mL 9.9mg	側管	30分	●													
3	アクチノマイシンD 注射用水	0.5mg/body 5mL	側管	緩徐に静注	●	●												
4	エトポシド 生理食塩液	100mg/m ² 500mL	側管	1時間※	●	●												
5	メトトレキサート 生理食塩液	300mg/m ² 1300mL	側管	12時間	●													
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	生理食塩液	500mL	メイン	投与終了まで								●						
2	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75mg/50mL 9.9mg	側管	30分								●						
3	ビンクリスチン 生理食塩液	1mg/m ² 必要量	側管	緩徐に静注								●						
4	シクロホスファミド 生理食塩液	600mg/m ² 250mL	側管	30分								●						

※ ラステットは溶解後3時間以内に投与終了