

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
オプジーホ+ CapeOX	21日間	中等度催吐性リスク

薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カペシタビン(ゼロダ)	2000mg/m <sup>2</sup>	2×朝・夕食後	●	→													●	内服14日間で終了					
アプレピタント125mg(イメド)	1cp	1×化学療法60～90分前	●																				
アプレピタント80mg(イメド)	1cp	1×朝		●	●																		

滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生理食塩液	50ml	メイン	15分	●																				
2	ニボルマブ	360mg	メイン	30分	●																				
	生理食塩液	100ml																							
3	生理食塩液	50ml	メイン	15分	●																				
4	グラニセトロン3mg	1バッグ	メイン	15分	●																				
	デキサメタゾン	3.3mg																							
5	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	メイン	2時間	●																				
	5%ブドウ糖	250mL																							
6	生理食塩液	100mL	メイン	15分	●																				

ニボルマブはインラインフィルターを使用