レジメン名称	1コース	催吐性リスク
S-1+CDDP	35日間	高度催吐性リスク（day8）

	薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	～	35
	S-1（ティーエスワン）	S-1の投与量に準ずる	2×朝・夕食後	●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	～	
	イメンド125mg	1cp	1×化学療法60～90分前								●														～	
	イメンド80mg	1cp	1×朝									●	●													
	デキサメタゾン	8mg	1×朝 or 2×朝・昼									●	●	●	○※	※○は嘔気によって5日目まで内服も可										

滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	～	35
1	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75mg 9.9mg	メイン	15分								●														～	
2	シスプラチン 生理食塩液	60mg/㎡ 400mL	メイン	2時間								●															
3	ソリタT3	500mL	メイン	2時間								●															
4	ソリタT3	500mL	メイン	2時間								●															
5	ソリタT3	500mL	メイン	2時間								●															