

| レジメン名称 | 1コース | 催吐性リスク   |
|--------|------|----------|
| SP3    | 21日間 | 高度催吐性リスク |

| 薬剤        | 用量          | 用法            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6                  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |
|-----------|-------------|---------------|---|---|---|---|----|--------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| S-1       | S-1の投与量に準ずる | 2×朝・夕食後       |   |   |   |   |    |                    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| イメンド125mg | 1cp         | 1×化学療法60～90分前 | ● |   |   |   |    |                    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| イメンド80mg  | 1cp         | 1×朝           |   | ● | ● |   |    |                    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| デキサメタゾン   | 8mg         | 2×朝・昼         |   | ● | ● | ● | ○* | ※○は嘔気によって5日目まで内服も可 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |

| 滴下順 | 薬剤                       | 用量                           | ルート | 投与時間   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|-----|--------------------------|------------------------------|-----|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1   | ラクテック                    | 500mL                        | メイン | 2時間    | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2   | ラクテック<br>硫酸マグネシウム        | 500mL<br>20mEq               | メイン | 2時間    | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3   | パロノセトロン0.75mg<br>デキサメタゾン | 500mL<br>9.9mg               | メイン | 15分    | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4   | シスプラチン<br>生理食塩液          | 60mg/m <sup>2</sup><br>400mL | メイン | 2時間    | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5   | 20%マンニトール                | 300mL                        | メイン | 30分    | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6   | フロセミド20mg/2mL            | 1A                           | 側管  |        | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7   | ソリタT3                    | 500mL                        | メイン | 1時間45分 | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8   | ソリタT3                    | 500mL                        | メイン | 2時間    | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9   | ソリタT3                    | 500mL                        | メイン | 2時間    | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

シスプラチン体重指示: 体重測定1日1検、毎朝食前測定 day1より体重測定開始day4まで継続 ⇒ day2～4の体重がday1より+2kgでフロセミド20mg 1A i.v.

シスプラチン尿量指示: 尿量1日3検、開始時刻は主治医確認、day4の指定時刻まで継続 ⇒ 8時間尿量が600mL以下の時、フロセミド20mg 1A i.v.

上記指示は状態によって変更されることが予想されるので主治医に確認すること