

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
nab-PTX+RAM	28日間	軽度催吐性リスク

滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	デキサメタゾン	6.6mg	メイン	15分	●							●								●													
	生理食塩液	50mL																															
	d-クロルフェニラミン	5mg			●																	●											
2	ラムシルマブ	8mg/kg	メイン	1時間	●															●													
	生理食塩液	250mL																															
3	生理食塩液	100mL	メイン	1時間※	●															●													
4	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100mg/m ²	メイン	30分	●							●								●													
	生理食塩液	50mL ^{※※}																															
5	生理食塩液	50mL	メイン	15分	●							●								●													

※ :サイラムザ後の生理食塩液は最初の2サイクルは必須。インフュージョンリアクションなければ3サイクル以降は全開で投与可。

※※:アルブミン懸濁型パクリタキセルは100mg生理食塩液20mLとなるように薬剤科にて調製

注: ラムシルマブ投与時は0.2μmまたは0.22μmのインラインフィルターを使用し、アブラキサン投与時はインラインフィルターは使用しない。