| レジメン名称 | 1コース | 催吐性リスク |
|---|---|---|
| GC（胆道癌） | 21日間 | 中等度催吐性リスク |

| | 薬剤 | 用量 | 用法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | デキサメタゾン | 8mg(16錠) | 2×朝・昼 | ／ | ● | ● | ○※ | | | | ／ | ● | ● | ○※ | | ※○嘔気によって4日目まで内服も可 | | | | | | | | |

| 滴下順 | 薬剤 | 用量 | ルート | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液 | 500mL | メイン | 2時間 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | グラニセトロン3mg<br>デキサメタゾン | 1バッグ<br>9.9mg | 側管 | 30分 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | シスプラチン<br>生理食塩液 | 25mg/㎡<br>250mL | 側管 | 1時間 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ゲムシタビン<br>生理食塩液 | 1000mg/㎡<br>100mL | 側管 | 30分 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ソリタT3 | 500mL | メイン | 2時間 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |