レジメン名称	1コース	催吐性リスク
IP(CPT−11+CDDP)	28日間	高度催吐性リスク(day1)、中等度催吐制リスク(day8,15)

	薬剤	用量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	イメンド125mg	1cp	1×化学療法60～90分前	●																											
	イメンド80mg	1cp	1×朝		●	●																									
	デキサメタゾン	8mg	2×朝・昼		●	●	●	○※				●	●	○※					●	●	○※										

滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロン3mg デキサメタゾン	1バッグ day1:9.9mg day8,15:6.6mg	メイン	30分	●							●							●												
2	イリノテカン 生理食塩液	60mg/㎡ 250mL	メイン	90分	●							●							●												
3	塩化カリウム 硫酸マグネシウム 生理食塩液	5mEq 4mEq 500mL	メイン	60分	●																										
4	塩化カリウム 硫酸マグネシウム 生理食塩液	5mEq 4mEq 500mL	メイン	60分	●																										
5	20%マンニトール	300mL	メイン	40分	●																										
6	シスプラチン 生理食塩液	60mg/㎡ 250mL	メイン	60分	●																										
7	塩化カリウム 生理食塩液	5mEq 500mL	メイン	60分	●																										
8	塩化カリウム 生理食塩液	5mEq 500mL	メイン	60分	●																										
3	生理食塩液	50mL	メイン	15分								●							●												